

## **Information zum Beschluss der STIKO zur 12. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung vom 18.10.2021**

Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und **empfiehlt eine Auffrischimpfung für Personen  $\geq 70$  Jahre** und für bestimmte Indikationsgruppen. Außerdem wird allen Personen (Unabhängig vom Alter), die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung empfohlen.

### **Folgenden Personen soll eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff frühestens 6 Monate nach erfolgter Grundimmunisierung angeboten werden:**

- Personen im Alter von  $\geq 70$  Jahren
- Bewohnende und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen. Aufgrund des erhöhten Ausbruchspotentials sind hier auch Bewohnende und Betreute im Alter von  $< 70$  Jahren eingeschlossen.
- Pflegepersonal und andere Tätige, die direkte Kontakte mit mehreren zu pflegenden Personen haben, in Einrichtungen der Pflege für (i) alte Menschen oder (ii) für andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Krankheitsverläufe
- Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt

Die Auffrischimpfung soll frühestens 6 Monate nach der aus zwei Impfstoffdosen bestehenden Grundimmunisierung verabreicht werden. Unabhängig davon, welcher Impfstoff bei der vorher erfolgten Immunisierung verwendet wurde, soll für die Auffrischimpfung ein mRNA-Impfstoff genutzt werden. Erfolgte die Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff soll möglichst der gleiche Impfstoff angewendet werden. Personen, die vor oder nach der COVID-19-Impfung eine labordiagnostisch gesicherte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine Auffrischimpfung empfohlen.

### **Optimierung der Grundimmunisierung mit der COVID-19 Vaccine Janssen**

Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, sollen zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung erhalten. Unabhängig vom Alter soll diesen Personen eine zusätzliche Impfstoffdosis eines mRNA-Impfstoffs ab 4 Wochen nach der Janssen-Impfung angeboten werden. Weitere Informationen dazu in der FAQ „Wie verhält es sich mit der Wirksamkeit und Impfdurchbrüchen beim Janssen Impfstoff (COVID-19 Vaccine Janssen)?“. Wenn nach der COVID-19-Vaccine Janssen-Impfstoffdosis eine labordiagnostische Infektion aufgetreten ist, wird derzeit keine weitere Impfung empfohlen. Die STIKO aktualisiert ihre COVID-19-Impfempfehlung und empfiehlt eine Auffrischimpfung für Personen  $\geq 70$  Jahre und für bestimmte Indikationsgruppen. Außerdem wird Personen, die eine Grundimmunisierung mit einer Impfstoffdosis COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben, zur Optimierung ihres Impfschutzes eine weitere Impfung empfohlen.

Quelle: [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ\\_Liste\\_STIKO\\_Empfehlungen.html](https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_STIKO_Empfehlungen.html)

Stand: 18.10.2021